

0 – 12個月
文章

疫苗注射

11 月 10, 2020

所有新生兒都需要注射一系列疫苗，抵抗多種有害疾病。通常這些疫苗非常安全、沒有或僅有少量副作用。這些疫苗的保護作用通常遠大於其副作用。

Author(s): 許靜儀姑娘

建議寶寶根據疫苗注射表進行注射，但如果出現不良情況，請推遲疫苗注射，若有疑問可向醫生／醫護人員尋求協助。



所有新生兒都需要注射一系列疫苗，抵抗多種有害疾病。通常這些疫苗非常安全、沒有或僅有少量副作用。這些疫苗的保護作用通常遠大於其副作用。

可能出現的副作用

- 寶寶比平常更易啼哭，脾氣暴躁及不愉快
- 注射疫苗處出現紅腫
- 寶寶出現低燒。可依照醫生建議給予退燒藥
- 如果寶寶持續發燒、尖叫不斷或注射疫苗處腫脹嚴重，請立即就醫
- 出現類似被防疫感染的輕度皮疹

何時不能注射疫苗

建議寶寶根據疫苗注射表進行注射，但如果出現以下情況，請推遲疫苗注射：

- 寶寶發燒或腹瀉
- 寶寶對之前的疫苗反應強烈
- 早產兒的疫苗注射需要遵從兒科醫生的建議
- 寶寶的家庭/兄妹對某種疫苗有不良反應的記錄
- 寶寶有急性發熱的疾病

若有疑問可向醫生 / 醫護人員尋求協助。

如欲了解更多疫苗資訊，請瀏覽以下衛生署網頁

參考

[疫苗資訊](#)

[立即分享](#)